

## Abitur 2020 Mathematik Geometrie VI

Gegeben sind die Punkte  $P(-2|3|0)$ ,  $R(2|-1|2)$  und  $Q(q|1|5)$  mit der reellen Zahl  $q$ , wobei  $Q$  von  $P$  genauso weit entfernt ist wie von  $R$ .

### Teilaufgabe Teil A 1a (3 BE)

Bestimmen Sie  $q$ .

(zur Kontrolle:  $q = -2$ )

### Teilaufgabe Teil A 1b (2 BE)

Ermitteln Sie die Koordinaten des Eckpunkts  $S$  der Raute PQRS. Zeigen Sie, dass PQRS kein Quadrat ist.

Gegeben sind in einem kartesischen Koordinatensystem die Ebene  $E: 4x_1 - 8x_2 + x_3 + 50 = 0$

und die Gerade  $g: \vec{X} = \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R}$ .

### Teilaufgabe Teil B a (1 BE)

Erläutern Sie, warum die folgende Rechnung ein Nachweis dafür ist, dass  $g$  und  $E$  genau einen gemeinsamen Punkt haben:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix} = -72 \neq 0$$

### Teilaufgabe Teil B b (5 BE)

Berechnen Sie die Größe des Schnittwinkels von  $g$  und  $E$  und zeigen Sie, dass  $S(0, 5|6, 5|0)$  der Schnittpunkt von  $g$  und  $E$  ist.

### Teilaufgabe Teil B c (6 BE)


Die Kugel  $K$  mit dem Mittelpunkt  $M(-13|20|0)$  berührt die Ebene  $E$ . Bestimmen Sie die Koordinaten des zugehörigen Berührungspunkts  $F$  sowie den Kugelradius  $r$ .

(zur Kontrolle:  $F(-5|4|2)$ ,  $r = 18$ )

### Teilaufgabe Teil B d (5 BE)

Weisen Sie nach, dass die Gerade  $g$  die Kugel  $K$  im Punkt  $T(3|12|-2)$  berührt.

Die Punkte  $M$ ,  $T$ ,  $S$  und  $F$  (vgl. die Aufgaben b, c und d) liegen in einer Ebene  $Z$ . Die nicht maßstabsgetreue Abbildung zeigt die Gerade  $g$ , den Schnitt der Ebene  $E$  mit der Ebene  $Z$  sowie den Schnitt der Kugel  $K$  mit der Ebene  $Z$ .



### Teilaufgabe Teil B e (4 BE)

Begründen Sie, dass das Viereck MTSF einen Umkreis besitzt. Berechnen Sie den Flächeninhalt dieses Vierecks.

### Teilaufgabe Teil B f (4 BE)

Durch Rotation des Vierecks MTSF um die Gerade MS entsteht ein Körper. Beschreiben Sie diesen Körper.

In einer Formelsammlung ist zur Berechnung des Volumens eines solchen Körpers die Formel  $V = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2 \cdot \pi \cdot b$  zu finden. Geben Sie für den beschriebenen Körper die Strecken an, deren Längen für  $a$  bzw.  $b$  einzusetzen sind.

## Lösung

## Teilaufgabe Teil A 1a (3 BE)

Gegeben sind die Punkte  $P(-2|3|0)$ ,  $R(2|-1|2)$  und  $Q(q|1|5)$  mit der reellen Zahl  $q$ , wobei  $Q$  von  $P$  genauso weit entfernt ist wie von  $R$ .

Bestimmen Sie  $q$ .

(zur Kontrolle:  $q = -2$ )

## Lösung zu Teilaufgabe Teil A 1a

## Länge eines Vektors

$P(-2|3|0)$ ,  $R(2|-1|2)$ ,  $Q(q|1|5)$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= \vec{Q} - \vec{P} = \begin{pmatrix} q \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q+2 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{RQ} &= \vec{Q} - \vec{R} = \begin{pmatrix} q \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q-2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Erläuterung: *Betrag eines Vektors*

Die Länge (bzw. der Betrag)  $|\vec{a}|$  eines Vektors  $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$  ist gegeben durch:

$$|\vec{a}| = \left| \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{PQ}| &= \left| \begin{pmatrix} q+2 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{(q+2)^2 + (-2)^2 + 5^2} = \sqrt{q^2 + 4q + 33} \\ |\overrightarrow{RQ}| &= \left| \begin{pmatrix} q-2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{(q-2)^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{q^2 - 4q + 17}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}|\overrightarrow{PQ}| &= |\overrightarrow{RQ}| \iff \sqrt{q^2 + 4q + 33} = \sqrt{q^2 - 4q + 17} \iff q^2 + 4q + 33 = q^2 - 4q + 17 \\ q^2 + 4q + 33 &= q^2 - 4q + 17 \quad | -q^2 + 4q - 33 \\ 8q &= -16 \quad \Rightarrow \quad q = -2\end{aligned}$$

## Teilaufgabe Teil A 1b (2 BE)

Ermitteln Sie die Koordinaten des Eckpunkts  $S$  der Raute PQRS. Zeigen Sie, dass PQRS kein Quadrat ist.

## Lösung zu Teilaufgabe Teil A 1b

## Koordinaten von Punkten ermitteln



$$\vec{S} = \vec{P} - \overrightarrow{RQ} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow S(2|1|-3)$$

Erläuterung: *Skalarprodukt*

Das Skalarprodukt zweier Vektoren  $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$  und  $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$  ergibt sich aus der Summe der Produkte der Komponenten der Vektoren.

$$\vec{a} \circ \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$$

$$\overrightarrow{PQ} \circ \overrightarrow{RQ} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0 - 4 + 15 = 11 \neq 0$$

Erläuterung: *Senkrechte Vektoren*

Das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren, die senkrecht zueinander stehen, ist gleich Null.

$\Rightarrow$  PQRS ist kein Quadrat

**Teilaufgabe Teil B a** (1 BE)

Gegeben sind in einem kartesischen Koordinatensystem die Ebene  $E: 4x_1 - 8x_2 + x_3 + 50 = 0$

und die Gerade  $g: \vec{X} = \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R}$ .

Erläutern Sie, warum die folgende Rechnung ein Nachweis dafür ist, dass  $g$  und  $E$  genau einen gemeinsamen Punkt haben:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix} = -72 \neq 0$$

**Lösung zu Teilaufgabe Teil B a**

**Lagebeziehung Gerade und Ebene**

Die Rechnung zeigt, dass der Normalenvektor  $\vec{n}_E = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix}$  und der Richtungsvektor der

Geraden  $g$  nicht senkrecht aufeinander liegen, d.h.  $g$  verläuft nicht parallel zur Ebene, sondern schneidet sie in einem Punkt.

Erläuterung: *Senkrechte Vektoren*

Das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren, die senkrecht zueinander stehen, ist gleich Null.

**Teilaufgabe Teil B b** (5 BE)

Berechnen Sie die Größe des Schnittwinkels von  $g$  und  $E$  und zeigen Sie, dass  $S(0, 5|6, 5|0)$  der Schnittpunkt von  $g$  und  $E$  ist.

**Lösung zu Teilaufgabe Teil B b**

**Winkel zwischen Gerade und Ebene**

$$E: 4x_1 - 8x_2 + x_3 + 50 = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{n}_E = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$g: \vec{X} = \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix}}_{\vec{v}}$$

Erläuterung: *Betrag eines Vektors*

Die Länge (bzw. der Betrag)  $|\vec{a}|$  eines Vektors  $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$  ist gegeben durch:


$$|\vec{a}| = \left| \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$|\vec{n}_E| = \left| \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{4^2 + (-8)^2 + 1^2} = \sqrt{81} = 9$$

$$|\vec{v}| = \left| \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{5^2 + 11^2 + (-4)^2} = \sqrt{162} = \sqrt{2 \cdot 9^2} = 9\sqrt{2}$$

Schnittwinkel  $\alpha$  bestimmen:

Erläuterung: Winkel zwischen Ebene und Gerade



Der **Sinus** des Winkels  $\alpha$  zwischen einer Geraden  $g$  und einer Ebenen  $E$  ist gegeben durch:

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{RV}_g \circ \vec{n}_E|}{|\overrightarrow{RV}_g| \cdot |\vec{n}_E|}$$

wobei  $\overrightarrow{RV}_g$  der Richtungsvektor der Geraden und  $\vec{n}_E$  der Normalenvektor der Ebene ist.

(Anmerkung: Man verwendet die Formel gerne ohne Betragsstriche im Zähler; also  $\sin \alpha = \frac{\overrightarrow{RV}_g \circ \vec{n}_E}{|\overrightarrow{RV}_g| \cdot |\vec{n}_E|}$ .

Aber mit Betragsstrichen wird immer der spitze Winkel bestimmt.)

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{v} \circ \vec{n}_E|}{|\vec{v}| \cdot |\vec{n}_E|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix} \right|}{\left| \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix} \right|} = \frac{|20 - 88 - 4|}{9\sqrt{2} \cdot 9} = \frac{72}{81\sqrt{2}} = \frac{8}{9\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \alpha = \sin^{-1} \left( \frac{8}{9\sqrt{2}} \right) \approx 38,94^\circ$$

**Lage eines Punktes**

$S$  in  $E$  und  $g$  einsetzen:

$$4 \cdot 0,5 - 8 \cdot 6,5 + 0 + 50 = 0 \quad \Rightarrow \quad S \in E$$

$$\begin{pmatrix} 0,5 \\ 6,5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{l} 0,5 = 3 + 5\lambda \\ 6,5 = 12 + 11\lambda \\ 0 = -2 - 4\lambda \end{array} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{l} \lambda = -\frac{1}{2} \\ \lambda = -\frac{1}{2} \\ \lambda = -\frac{1}{2} \end{array}$$

$$\Rightarrow \quad S \in g$$


**Teilaufgabe Teil B c** (6 BE)

Die Kugel  $K$  mit dem Mittelpunkt  $M(-13|20|0)$  berührt die Ebene  $E$ . Bestimmen Sie die Koordinaten des zugehörigen Berührungspunkts  $F$  sowie den Kugelradius  $r$ .

(zur Kontrolle:  $F(-5|4|2)$ ,  $r = 18$ )

**Lösung zu Teilaufgabe Teil B c**

**Lagebeziehung Ebene und Kugel**



$$E: 4x_1 - 8x_2 + x_3 + 50 = 0$$

Lot  $h$  auf die Ebene  $E$  durch  $M$ :

$$h: \vec{X} = \begin{pmatrix} -13 \\ 20 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{n}_E}$$

### Schnitt Ebene und Gerade

Lot  $h$  mit Ebene  $E$  schneiden:  $h \cap E$

Erläuterung: *Schnitt Ebene und Gerade*

Schneidet eine Gerade  $g: \vec{X} = \vec{Q} + \lambda \cdot \vec{v}$  eine Ebene  $E$  in einem Punkt  $P$ , dann erfüllt die Geradengleichung für ein bestimmten Wert von  $\lambda$  (von  $g$ ) die Normalenform der Ebene  $E$ .

Man setzt  $g$  in  $E$  ein und löst nach  $\lambda$  auf.

Hier wird also  $h$  in  $E$  eingesetzt und nach  $\mu$  aufgelöst.

$$\begin{aligned} h \cap E: \quad 4 \cdot (-13 + 4\mu) - 8 \cdot (20 - 8\mu) + \mu + 50 &= 0 \\ -52 + 16\mu - 160 + 64\mu + \mu + 50 &= 0 \\ 81\mu &= 162 \\ \mu &= 2 \end{aligned}$$

Erläuterung: *Einsetzen*

$\mu = 2$  wird in die Geradengleichung des Lotes  $h$  eingesetzt.

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \begin{pmatrix} -13 \\ 20 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow F(-5|4|2) \end{aligned}$$

### Länge eines Vektors

$$\overrightarrow{MF} = \vec{F} - \vec{M} = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -13 \\ 20 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -16 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Erläuterung: *Betrag eines Vektors*

Die Länge (bzw. der Betrag)  $|\vec{a}|$  eines Vektors  $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$  ist gegeben durch:

$$|\vec{a}| = \left| \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$


$$r = |\overrightarrow{MF}| = \left| \begin{pmatrix} 8 \\ -16 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{8^2 + (-16)^2 + 2^2} = \sqrt{324} = 18$$

### Teilaufgabe Teil B d (5 BE)

Weisen Sie nach, dass die Gerade  $g$  die Kugel  $K$  im Punkt  $T(3|12|-2)$  berührt.

### Lösung zu Teilaufgabe Teil B d

#### Lage eines Punktes



$$g: \vec{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ -2 \end{pmatrix}}_{\vec{T}} + \lambda \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix}}_{\vec{v}}$$

$\vec{v}$  ist Richtungsvektor von  $g$ .

$T \in g$  für  $\lambda = 0$

**Länge eines Vektors**

$$\overrightarrow{MT} = \vec{T} - \vec{M} = \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -13 \\ 20 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Erläuterung: *Betrag eines Vektors*

Die Länge (bzw. der Betrag)  $|\vec{a}|$  eines Vektors  $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$  ist gegeben durch:

$$|\vec{a}| = \left| \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$|\overrightarrow{MT}| = \left| \begin{pmatrix} 16 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{16^2 + (-8)^2 + (-2)^2} = \sqrt{324} = 18 = r$$

**Lagebeziehung von Vektoren**

$$\begin{pmatrix} 16 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix} = 80 - 88 + 8 = 0$$


Erläuterung: *Senkrechte Vektoren*

Das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren, die senkrecht zueinander stehen, ist gleich Null.

$$\Rightarrow \overrightarrow{MT} \perp g$$

**Teilaufgabe Teil B e** (4 BE)


Die Punkte  $M, T, S$  und  $F$  (vgl. die Aufgaben b, c und d) liegen in einer Ebene  $Z$ . Die nicht maßstabsgetreue Abbildung zeigt die Gerade  $g$ , den Schnitt der Ebene  $E$  mit der Ebene  $Z$  sowie den Schnitt der Kugel  $K$  mit der Ebene  $Z$ .



Begründen Sie, dass das Viereck MTSF einen Umkreis besitzt. Berechnen Sie den Flächeninhalt dieses Vierecks.

**Lösung zu Teilaufgabe Teil B e**

**Lagebeziehung von Vektoren**



$$\overline{MF} \perp \overline{FS} \quad (\text{s. Teilaufgabe Teil B c})$$

$$\overline{MT} \perp \overline{TS} \quad (\text{s. Teilaufgabe Teil B d})$$

$$\Rightarrow F \text{ und } T \text{ liegen auf dem Thaleskreis über } [MS]$$

**Länge eines Vektors**

$$F(-5|4|2)$$

$$S(0, 5|6, 5|0)$$

$$r = \overline{MF} = \overline{MT} = 18$$

$$\overrightarrow{FS} = \vec{S} - \vec{F} = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 6,5 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,5 \\ 2,5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Erläuterung: *Betrag eines Vektors*

Die Länge (bzw. der Betrag)  $|\vec{a}|$  eines Vektors  $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$  ist gegeben durch:

$$|\vec{a}| = \left| \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$|\overrightarrow{FS}| = \left| \begin{pmatrix} 5,5 \\ 2,5 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{5,5^2 + 2,5^2 + (-2)^2} = \sqrt{\frac{81}{4}} = \frac{9}{\sqrt{2}} = \frac{9}{2}\sqrt{2}$$

$$A_{\text{Viereck}} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot |\overrightarrow{FS}| \cdot r = 18 \cdot \frac{9}{2}\sqrt{2} = 81\sqrt{2}$$


#### Teilaufgabe Teil B f (4 BE)

Durch Rotation des Vierecks MTSF um die Gerade MS entsteht ein Körper. Beschreiben Sie diesen Körper.

In einer Formelsammlung ist zur Berechnung des Volumens eines solchen Körpers die Formel  $V = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2 \cdot \pi \cdot b$  zu finden. Geben Sie für den beschriebenen Körper die Strecken an, deren Längen für  $a$  bzw.  $b$  einzusetzen sind.

#### Lösung zu Teilaufgabe Teil B f

*Volumen des Rotationskörpers ermitteln*



Der Körper besteht aus zwei Kegeln, deren Grundkreise zusammenfallen.

$a$ : Länge der Strecke  $[FT]$

$b$ : Länge der Strecke  $[MS]$